

Quelle: Meyer, C. et al. (2011): Pathologisches Glücksspielen und Epidemiologie (PAGE): Entstehung, Komorbidität, Remission und Behandlung. Endbericht, S. 78

Lebenszeitprävalenz	Allgemeinbevölkerung	Personen mit Diagnose Pathologisches Glücksspiel (5-10 DSM-IV-Kriterien)
	N=4.075*	N=442**
Störungen durch Substanzkonsum insgesamt	25,8%	89,8%
- Substanzmissbrauch***	5,2 %	26,6%
- Substanzabhängigkeit exkl. Tabak	4,1%	44,3%
- Tabakabhängigkeit	20,9%	78,2%
- Störungen durch Alkoholkonsum	8,3%	54,9%
- Störungen durch illegale Drogen	1,2%	22,5%
Affektive Störungen insgesamt	12,3%	63,1%
- Depressive Störungen durch illegale Drogen	11,5%	57,2%
- Major Depression	10%	49,1%
- Dysthyme Störung	2,5%	22,4%
- Hypomanie****	0,3 %	0,2%
- Bipolare Störungen I	0,4%	5,9%
- Bipolare Störungen II	0,1%	1,4%
Angststörungen insgesamt	6,5%	37,1%
- Panikattacke	5,8%	23,8%
- Panikstörung ohne Agoraphobie	0,9%	6,3%
- Panikstörung mit Agoraphobie	1,3%	7,7%
- Agoraphobie ohne Panikstörung in der Vorgeschichte	1,1%	5,4%
- Soziale Phobie	1,9%	13,4%
- Angststörung nicht näher bezeichnet	0,5%	2,7%
- Generalisierte Angststörung	0,8%	5,2%
- Posttraumatische Belastungsstörung	1,4%	15,5%
Psychische Störungen insgesamt	35,7%	95,5%
- Psychische Störungen exkl. Tabakabhängigkeit	22,9%	87,7%
- Psychische Störungen exkl. Substanzstörungen	16,1%	71,1%

* basierend auf einer Einwohnermeldeamtsstichprobe der 18- bis 64-jährigen Bevölkerung Lübecks und 46 angrenzender Gemeinden (Meyer et al. 2000, Nervenarzt: 71, S. 535-542)

** Rekrutierung der TN durch Telefonate (Festnetz/mobil) und an Spielorten im Jahr 2010

*** Diagnose Substanzmissbrauch wurde nicht bei Vorliegen einer Substanzabhängigkeit für die gleiche Substanzgruppe vergeben

****Diagnose nur in ICD-10 codierbar

Quelle: Dauber, H. et al.: Suchthilfe in Deutschland 2018 – Jahresbericht der Deutschen Suchthilfestatistik (DSHS), S. 21 f.

Substanzbezogene Komorbiditäten in ambulanten Einrichtungen	
<i>7.283 Personen mit Hauptdiagnose F63.0 PG aus 731 ambulanten Einrichtungen</i>	
Zusätzliche Einzeldiagnose	
F10 Alkohol	13,0 %
F11 Opioide	0,6 %
F12 Cannabinoide	8,0 %
F13 Sedativa/ Hypnotika	0,3 %
F14 Kokain	2,5 %
F15 Stimulanzien	3,2 %
F17 Tabak	23,2 %
F63.8 / F68.8 Exzessive Mediennutzung	1,0 %

Substanzbezogene Komorbiditäten in stationären Einrichtungen	
<i>762 Personen mit Hauptdiagnose F63.0 PG aus 126 stationären Einrichtungen</i>	
Zusätzliche Einzeldiagnose	
F10 Alkohol	28,6 %
F11 Opioide	1,0 %
F12 Cannabinoide	17,6 %
F13 Sedativa/ Hypnotika	0,8 %
F14 Kokain	7,9 %
F15 Stimulanzien	7,5 %
F17 Tabak	60,0 %
F63.8 / F68.8 Exzessive Mediennutzung	0,8 %